

SKRÓCONA INSTRUKCJA UPRAWY NA NASIONA ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ BAKUS

Produkcja nasienna

- **Duży potencjał plonu** nasion 15 - 20 dt/ha.
- **Termin dojrzewania** – w pierwszej dekadzie lipca, przed żniwami zbożowymi.
- **Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym** w okresie późnoletnim od 25 sierpnia do 10 września.
- **Norma wysiewu** 18 – 20 kg/ha, **rozstawa rzędów** 12,5 cm, **głębokość siewu** 1-2 cm.
- **Nawożenie mineralne:** nawozy azotowe w formie szybko działającej: równomierny wysiew nawozów wpływa korzystnie na wyrównane dojrzewanie nasion.
 - **Przedsewnie pełne** nawożenie: N: 30kg/ha, P₂O₅: 80kg/ha, K₂O: 100–120 kg/ha.
 - **Wiosną pogłównie** azot w dawce 50-75kg/ha w okresie ruszenia wegetacji: Zalecane jest podzielenie dawki na dwie części, pierwsza możliwie jak najwcześniej, druga w fazie pełnego krzewienia.
- **Niszczanie chwastów dwuliściennych środkami:**
 - *Starane 333 EC* (fluroksypyr - 333 g) – 0,54 l/ha.
- **Niszczanie chwastów jednoliściennych** (miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna - kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną środkami:
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Zalecana ochrona chemiczna przeciw chorobom grzybowym.** Nie stosować podczas kwitnienia roślin.
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Możliwość zastosowania antywylegacza** w fazie początku strzelania w źdźbło (pierwszego wyczuwalnego kolanka)
 - *Optimus 175 EC, Optimus Super 175 EC* (trineksapak etylu 175g/l) 1,1 l/ha
- **Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu**
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Zbiór jednofazowy kombajnem** przy pełnej dojrzałości nasion.
- **Zbiór nasion dwufazowy.**
 - Koszenie na pokosy 1-2 dni od początku osypywania się nasion.
 - Optymalna wilgotność nasion podczas kładzenia na pokos 40-45% (z każdym dniem wilgotność nasion spada o około 2-3 %).
 - Młócenie po 4-8 dniach (w zależności od pogody).
- **Zalecany okres użytkowania plantacji** nasiennych 1 rok.

SKRÓCONA INSTRUKCJA UPRAWY NA NASIONA ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ BAKUS

UWAGA

⇒ Trawy dojrzewają nie równomiernie. Dojrzewanie zaczyna się od szczytów kłosów czy wiech i przesuwa się ku dołowi. Na części pola mniej zasobnej w wodę mogą dojrzewać o dzień lub dwa wcześniej, natomiast na polu położonym niżej mogą dojrzewać później. Różnice w dojrzewaniu obserwujemy również po niedokładnym rozsianiu nawozów azotowych oraz na plantacjach wyległych.



Zbiór we właściwym terminie. Brak osypanych nasion.



Zbiór opóźniony. Straty nasion w wyniku osypania