

SKRÓCONA INSTRUKCJA UPRAWY NA NASIONA ŻYCICY WESTRWOLDZKIEJ TELGA

Produkcja nasienna

- Duży potencjał plonu nasion 14 - 16 dt/ha.
- Termin dojrzewania – w pierwszej połowie lipca, przed zniwami zbożowymi.
- Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym w okresie późnoletnim od 25 sierpnia do 10 września.
- Norma wysiewu 16 – 18 kg/ha, rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu 1,0-2,0 cm.
- Nawożenie mineralne: nawozy azotowe w formie szybko działającej:
 - Przed siewem pełne nawożenie: N: 30kg/ha, P₂O₅: 80kg/ha, K₂O: 100–120 kg/ha.
 - Wiosną pogłównie w okresie ruszenia wegetacji: N: 60 kg/ha
 - Nawożenie pod kłos (od fazy 2-go kolanka do zakończenia kłoszenia) – N: 30 kg/ha
- Niszczanie chwastów dwuliściennych środkami:
 - *Starane 333 EC* (fluoksypyr - 333 g) – 0,54 l/ha.
- Niszczanie chwastów jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna - kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną środkami:
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- Zalecana ochrona chemiczna przeciw chorobom grzybowym. Nie stosować podczas kwitnienia roślin.
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania w źdźbło (pierwszego wyczuwalnego kolanka przy wysokości roślin około 15-25 cm)
 - *Optimus 175 EC, Optimus Super 175 EC* (trineksapak etylu 175g/l) 1,1 l/ha
 - Duży wpływ na wyleganie plantacji ma zbyt wysoki poziom nawożenia azotowego, lub opóźniony termin nawożenia azotem.
- Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- Zbiór jednofazowy kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion.
- Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 1 rok.